Salutis Sp. z o.o.
Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

Aleric Deslo Active 2,5 mg x 10 tabl.

Cena: 15,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka	2,5 mg
Opakowanie	10 tabl.
Postać	tabl.uleg.rozp.w j.ustnej
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Substancja czynna	Desloratadinum

Opis produktu

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Aleric Deslo Active to lek przeciwalergiczny. Zmniejszona dawka substancji czynnej 2,5mg desloratadyny jest dostosowana do potrzeb pacjentów dziecięcych.

Skład:
1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera: substancję czynną – 2,5mg desloratadyny oraz substancje pomocnicze: polakrylina potasowa, kwas cytrynowy jednowodny, żelaza tlenek czerwony (E 172), magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa, aromat Tutti Frutti (zawierający także glikol propylenowy), aspartam (E 951), celuloza mikrokrystaliczna, mannitol suszony rozpyłowo i potasu wodorotlenek (do ustalenia pH).

Działanie:
Lek antyalergiczny Aleric Deslo Active w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej. Dzięki nim łatwiej jest kontrolować reakcję alergiczną i jej objawy. Stosowanie tabletek łagodzi takie symptomy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa jak: katar, swędzenie w nosie, swędzenie podniebienia oraz łzawiące i piekące oczy. Aleric Deslo Active przynosi ulgę także w alergicznych objawach skórnych – świąd, pokrzywka. Mechanizm działania desloratadyny opiera się między innymi na hamowaniu uwalniania cytokin wywołujących reakcję zapalną z ludzkich komórek tucznych i granulocytów zasadochłonnych. Atutem desloratadyny jest brak wpływu na zdolności psychoruchowe.

Zastosowanie:
Aleric Deslo Active 2,5mg to lek łagodzący objawy towarzyszące alergicznemu zapaleniu błony śluzowej nosa oraz pokrzywce.

Informacje dodatkowe:
Lek zawiera aspartam. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na desloratadynę, loratadynę lub substancje pomocnicze. Nie jest zalecane stosowanie u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie stosować u dzieci poniżej 6. roku życia.

Działanie niepożądane:
Podczas stosowania leku mogą wystąpić działania niepożądane takie jak: uczucie zmęczenia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, bóle

Salutis Sp. z o.o.
Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

głowy.

Dawkowanie:
Do stosowania doustnego. Dorośli i młodzież od 12. roku życia: 5mg raz na dobę; dzieci od 6. do 11. roku życia: 2,5mg raz na dobę. W przypadku okresowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (występowanie objawów nie częściej niż przez 4 dni w tygodniu lub nie dłużej niż 4 tygodnie) leczenie należy zakończyć po ustąpieniu objawów, a wznowić w razie ich ponownego wystąpienia. W przypadku przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 dni w tygodniu lub częściej i dłużej niż 4 tygodnie) można kontynuować leczenie w okresie ekspozycji na alergen. Leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz pokrzywki desloratadyną bez wizyty u lekarza nie może trwać dłużej niż 10 dni. Tabletki Aleric Deslo Active nie wymagają popijania, samoczynnie ulegają rozpadowi w ustach. Tabletkę zażyć bezpośrednio po otwarciu blistra, nie rozkruszać. Można stosować niezależnie od przyjmowanych posiłków.