Salutis Sp. z o.o.
Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

Altabactin maść (250j.m.+5mg)/g 20 g

Cena: 15,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka	(250j.m.+5mg)/g
Opakowanie	20 g
Postać	maść
Producent	SANDOZ GMBH
Substancja czynna	Bacitracinum, Neomycinum

Opis produktu

W miejscowym leczeniu bakteryjnych zakażeń obejmujących małe obszary skóry wskazane jest stosowanie maści Altabactin 250j.m.+5mg/g. Mechanizm jej działania opiera się na właściwościach dwóch antybiotyków – bacytracyny i neomycyny.

Składniki:
1g maści zawiera – 250 IU bacytracyny (Bacitracinum) w postaci bacytracyny cynkowej i 5mg neomycyny (Neomycinum) w postaci neomycyny siarczanu oraz substancje pomocnicze: lanolina i parafina ciekła.

Działanie:
Skojarzone działanie dwóch antybiotyków – bacytracyny i neomycyny stanowi o sile maści Altabactin oraz o szerokim zakresie jej działania. Neomycyna hamuje biosyntezę białka w komórce bakteryjnej. Bacytracyna to antybiotyk o działaniu bakteriobójczym. Bacytracyna zwalcza głównie bakterie Gram-dodatnie, natomiast neomycyna – Gram-dodatnie i Gram-ujemne. Maść Altabactin nie działa na grzyby i wirusy.

Zastosowanie:
Maść Altabactin 250j.m.+5mg/g przeznaczona jest do miejscowego leczenia bakteryjnych zakażeń skóry, w tym: drobnych zakażonych ran oraz zakażeń skóry w przebiegu oparzeń i odmrożeń. Do stosowania wyłącznie na małych obszarach skóry.

Informacje dodatkowe:
Nie jest wskazane jednoczesne stosowanie maści Altabactin oraz antybiotyków aminoglikozydowych o działaniu ogólnoustrojowym, ma to związek ze zwiększonym ryzykiem skumulowanego działania toksycznego. Długotrwałe stosowanie obarczone jest ryzykiem nadkażenia opornymi drobnoustrojami, zalecane jest wówczas wprowadzenie leczenia przeciwgrzybiczego lub przeciwbakteryjnego. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub wtórnego zakażenia przerwać używanie maści. Podczas stosowania maści może dojść do reakcji fototoksycznej w trakcie ekspozycji na światło słoneczne. Ze względu na obecność lanoliny może dojść do miejscowej reakcji alergicznej.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne maści: bacytracynę, neomycynę, a także na inne antybiotyki aminoglikozydowe lub na pozostałe składniki leku. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie nadaje się do stosowania na dużych powierzchniach ciała, w ciężkich uszkodzeniach skóry, nie stosować długotrwale, gdyż istnieje ryzyko nefrotoksycznego i

ototoksycznego działania neomycyny. Przeciwwskazaniem są ciężkie zaburzenia czynności serca lub nerek. Nie stosować u pacjentów z istniejącym wcześniej uszkodzeniem narządu słuchu. Nie stosować maści do przewodu ucha zewnętrznego w przypadku perforacji błony bębenkowej. Nie stosować do oczu, na błony śluzowe, na rany głębokie lub kłute, sączące zmiany chorobowe, ciężkie oparzenia lub duże powierzchnie uszkodzonej skóry.

Działania niepożądane:
Maść może powodować występowanie objawów niepożądanych, choć jest to bardzo rzadkie zjawisko.

Sposób użycia:
Do użytku miejscowego. Maść należy aplikować 2-3 razy na dobę. Zmienione chorobowo miejsce smarować cienką warstwą maści. W niektórych przypadkach można przykryć miejsce aplikacji opatrunkiem. Czas leczenia nie powinien przekraczać 7 dni.