



Deflegmin 30 mg x 20 tabl.



Cena: 15,00 PLN

#### Opis słownikowy

Dawka	0,03 g
Opakowanie	20 tabl.(blister)
Postać	tabl.
Producent	ICN POLFA RZESZÓW S.A.
Substancja czynna	Ambroxoli hydrochloridum

#### Opis produktu

Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z utrudnieniem odkrztuszania gęstej, nadmiernie lepkiej wydzieliny oskrzelowej, np. przewlekłe zapalenie oskrzeli i jego zaostrzenia, astmatyczne zapalenie oskrzeli.

**Skład:**  
1 tabletkę zawiera 30 mg chlorowodoru ambroksolu.

#### Działanie:

Ambroksol to metabolit bromheksydyny o działaniu mukolitycznym. Upłynnia wydzielinę oskrzelową i zmniejsza lepkość śluzu prawdopodobnie na drodze depolimeryzacji makrocząsteczek kwaśnych mukopolisacharydów. Dzięki temu ułatwia odkrztuszanie, zwiększa drożność oskrzeli, łagodzi kaszel. Zwiększa także częstość ruchów rzęsek i przyspiesza transport śluzowo - rzęskowy. Pobudza wytwarzanie substancji powierzchniowo czynnej (surfaktantu) przez pneumocyty typu II i komórki Clara. Surfaktant ułatwia oddzielanie pasm lepkiego śluzu od ściany oskrzeli i ich transport na całej długości drzewa oskrzelowego, a zwłaszcza w drobnych pozbawionych rzęsek oskrzelach. Surfaktant pobudza także aktywność fagocytarną makrofagów, chroniąc nabłonek dróg oddechowych przed chorobotwórczymi bakteriami.

#### Wskazania:

Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z utrudnieniem odkrztuszania gęstej, nadmiernie lepkiej wydzieliny oskrzelowej, np. przewlekłe zapalenie oskrzeli i jego zaostrzenia, astmatyczne zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa, rozstrzenia oskrzeli, zapalenie krtani, zapalenie zatok obocznych nosa, w okresie przed- i pooperacyjnym w celu uniknięcia powikłań ze strony układu oddechowego (zwłaszcza u chorych w podeszłym wieku).

#### Dawkowanie:

Dorośli: Doustnie, 3 razy dziennie po 1 tabletkę. W długotrwałej terapii dawkę można zmniejszyć do 2 razy dziennie po 1 tabletkę. Lek należy przyjmować po jedzeniu, popijając niewielką ilością płynu.

#### Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na ambroksol. Leku nie należy stosować przy owrzodzeniach żołądka, dwunastnicy i jelit.



Salutis Sp. z o.o.  
Trześcińska 59i, Lublin  
+48 605780782

*Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.*