



Cena: 26,34 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,05 g/1g
Opakowanie	50 g (tuba)
Postać	krem
Producent	DOLORGIET PHARMACEUTICALS
Substancja czynna	Ibuprofenum

Opis produktu

Wskazaniami do stosowania kremu Dolgit są: leczenie miejscowe i wspomagające zwyrodnieniowych chorób stawów, chorób reumatycznych stawów i kręgosłupa. Obrzęki i stany zapalne tkanek miękkich okołostawowych (zapalenie kaletki maziowej,

Skład:

1 g kremu lub żelu zawiera 50 mg ibuprofenu.

Działanie:

Niesteroidowy lek przeciwzapalny, pochodna kwasu propionowego, o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Hamuje aktywność cyklooksygenazy prostaglandynowej (hamowanie syntezy eikozanoidów, zmniejszanie zawartości kwasu arachidonowego w granulocytach). Działa przeciwagregacyjnie na płytki krwi. Zastosowany miejscowo łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i odczyn zapalny. Podany na skórę szybko wchłania się, dzięki czemu akumulacja układowa leku jest minimalna. Wykazuje dobrą penetrację do stawów, gdzie wywołuje silny efekt przeciwzapalny po około 30 min.

Wskazania:

Leczenie miejscowe i wspomagające zwyrodnieniowych chorób stawów, chorób reumatycznych stawów i kręgosłupa. Obrzęki i stany zapalne tkanek miękkich okołostawowych (zapalenie kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgnistych, więzadeł i torebki stawowej), sztywność barku, bóle mięśniowe, urazy powstałe na skutek uprawiania sportu (stłuczenia, skręcenia).

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na ibuprofen oraz na inne leki z grupy niesteroidowych przeciwzapalnych. Nadwrażliwość na substancje pomocnicze. Nie stosować na otwarte rany i błony śluzowe. Nie zaleca się stosowania w ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 14 r.ż. Unikać kontaktu preparatu z oczami i błonami śluzowymi.

Dawkowanie:

Do stosowania miejscowego. Pasek kremu lub żelu (długości 4-10 cm) nakłada się i wciera 3-4 razy dziennie w miejsca chorobowo zmienione. W przypadku dużych krwiaków skręceń można rozpocząć stosowanie kremu pod opatrunkiem okluzyjnym. Penetracja substancji czynnej może być zwiększona przez jonoforezę (żel nanosi się pod katodę i prowadzi zabieg przez 15 min). W chorobach reumatycznych preparat stosuje się najczęściej przez 4 tyg., przy urazach powstałych na skutek uprawiania sportu - przez 2 tyg.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.