Salutis Sp. z o.o.
Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

Elmetacin aerozol leczniczy 50 ml

Cena: 40,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,01 g/1g
Opakowanie	50 ml
Postać	aer.leczniczy
Producent	STADA ARZNEIMITTEL AG
Substancja czynna	Indometacinum

Opis produktu

Elmetacin stosowany jest miejscowo w bólach i stanach zapalnych towarzyszących: zmianom reumatycznym tkanek miękkich (zapalenie ścięgien, pochewek ścięgnistych, zesztywnienia stawów, zapalenie mięśni i torebek stawowych), zaostrzeniu

Skład:
1 ml (0,8 g) aerozolu zawiera 8 mg indometacyny.

Działanie:
Indometacyna działa bardzo silnie przeciwzapalnie, silnie przeciwbólowo, słabo przeciwgorączkowo przez hamowanie cyklooksygenazy, co blokuje syntezę cyklicznych nadtlenków, prostaglandyn, tromboksanów, prostacykliny. Wykazuje ponadto działanie przeciwobrzękowe. Stężenie indometacyny jest w leczonych tkankach wyższe niż we krwi. Zastosowana zewnętrznie wywiera działanie miejscowe.

Wskazania:
Miejscowo w bólach i stanach zapalnych towarzyszących: zmianom reumatycznym tkanek miękkich (zapalenie ścięgien, pochewek ścięgnistych, zesztywnienia stawów, zapalenie mięśni i torebek stawowych), zaostrzeniu choroby zwyrodnieniowej stawów, tępym urazom sportowym i powypadkowym (skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia).

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na lek, ciąża, okres karmienia piersią. Nie stosować na otwarte rany, błony śluzowe i spojówki. Jeśli pacjent stosuje jednocześnie indometacynę w innej postaci, należy liczyć sumaryczną dawkę, tak aby nie przekroczyć 200 mg na dobę.
Uwaga. W przypadku przedawkowania, nadwrażliwości lub błędnego użycia należy pamiętać o przeciwwskazaniach jak dla ogólnego stosowania indometacyny: czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, zapalenie jelit, wrzodziejące zapalenie okrężnicy, padaczka, parkinsonizm, ciężkie choroby psychiczne, skazy krwotoczne, astma oskrzelowa, ciąża i okres karmienia piersią, łączenie z antykoagulantami, kwasem acetylosalicylowym. Ostrożnie stosować w niewydolności mięśnia sercowego, nerek, wątroby, w czasie jednoczesnego leczenia sulfonamidami, u chorych z zaburzeniami widzenia oraz przy współistniejących chorobach zakaźnych ze względu na możliwość maskowania przez indometacynę objawów zakażenia.

Salutis Sp. z o.o.
Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

Dawkowanie:
Dorośli: miejsce chore spryskiwać roztworem 3-5 razy dziennie, w dawce 10 naciśnięć aplikatora aerozolowego. Maksymalna dawka dobowa wynosi 25 ml (200 mg indometacyny) i może być stosowana wyjątkowo, maksimum kilka dni.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.