Salutis Sp. z o.o.
Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

Etopiryna x 50 tabl.



Cena: 15,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,3g+0,1g+0,05g
Opakowanie	50 tabl.(fiol.)
Postać	tabl.
Producent	ZAKŁADY FARM. "POLPHARMA" S.A.
Substancja czynna	Acetylsalicylicum ac., Ethylsalicyl., Co

Opis produktu

Etopiryna jest lekiem stosowanym w leczeniu bólów głowy oraz bólów o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego.

Skład:
1 tabletka zawiera: kwas acetylosaslicylowy 300 mg, etenzamid 100 mg, kofeina 50 mg. Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna

Wskazania:
• bóle głowy
• bóle o umiarkowanym nasilenie, zwłaszcza pochodzenia zapalnego

Dawkowanie:
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1-2 tabletki jednorazowo lub w razie potrzeby tę samą dawkę co 8 godzin. Leku nie należy stosować dłużej niż kilka dni. U dorosłych nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę a u dzieci w wieku od 12 do 16 lat nie więcej niż 3 tabletki na dobę. Tabletki należy przyjmować po posiłku, popijając dużą ilością wody.

Przeciwwskazania:
• uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek ze składników leku
• uczulenie na inne niestereoidowe leki przeciwzapalne
• jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna
• jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
• jeśli u pacjenta występuje czynna niewydolność nerek, wątroby lub serca
• jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepliwości krwi
• jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
• u dzieci w wieku do lat 12
• nie stosować w ostatnim trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią

Działania niepożądane:
Zaburzenia żołądka i jelit: niestrawność, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności, wymioty, brak łaknienia, bóle brzucha, krwawienie z przewodu pokarmowego, uszkodzenie błony śluzowej żołądka, uczynnienie choroby wrzodowej
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby, szczególnie u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym, gorączką reumatoidalna lub chorobą wątroby; przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy krwi, fosfatazy oraz stężenia bilirubiny.
Zaburzenia układu nerwowego: szumy uszne, zaburzenia słuchu, zawroty głowy
Zaburzenia nerek i dróg moczowych: białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek
Zaburzenia serca: niewydolność serca
Zaburzenia naczyniowe: nadciśnienie
Zaburzenia krwi i układu chłonnego: małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, leukopenia, agranulocytoza, eozynopenia, zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia i wydłużenie czasu protrombinowego
Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości: wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.