



Cena: 20,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,5g+0,2g+0,025g
Opakowanie	8 sasz.a 13g
Postać	gran.do p.syr.
Producent	BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.
Substancja czynna	Paracetamol, Ac.ascorb. Pheniramin ma

Opis produktu

Jedna saszetka leku Fervex zawiera aż trzy substancje czynne, które łagodzą objawy grypy i przeziębienia. Działający przeciwbólowo i przeciwgorączkowo paracetamol został wzmocniony udrożniającym nos maleinianem feniraminy oraz witaminą C.

Skład:

Zawartość w 1 saszetce: paracetamol – 500mg, kwas askorbowy – 200mg, maleinian feniraminy – 25mg oraz substancje pomocnicze: sacharoza – 11,5g, bezwodny kwas cytrynowy, guma akacjowa, sacharyna sodowa, naturalny aromat cytrynowo-rumowy.

Działanie:

Fervex to złożony lek, który zawiera w składzie aż trzy substancje czynne. Paracetamol to jeden z najbardziej popularnych środków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, dzięki czemu pomaga łagodzić wysoką temperaturę, często występującą w infekcjach. Maleinian feniraminy zmniejsza dyskomfort związany z zatkanym nosem i łzawieniem oczu. Ze względu na swoją zdolność do redukcji przekrwienia i obrzęków błon śluzowych udrożnia nos, ułatwia oddychanie, ogranicza kichanie oraz łzawienie. Całości działania przeciwgrypowego dopełnia witamina C, która wzmacnia funkcjonowanie układu odpornościowego.

Zastosowanie:

Lek Fervex polecany w celu doraźnego leczenia objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych z występującym bólem głowy, gorączką, zapaleniem błony śluzowej nosa i gardła. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci powyżej 15. roku życia.

Informacje dodatkowe:

Lek zawiera sacharozę. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu, ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek, jaskry z zamkniętym kątem przesączania, przerostem prostaty z utrudnionym oddawaniem moczu, nietolerancji fruktozy, zespołu złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoboru sacharazy-izomaltazy, stosowania innych preparatów zawierających paracetamol oraz u dzieci poniżej 15. roku życia. Nie zaleca się przyjmowania leku kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci powyżej 15. roku życia: 1 saszetka 2-3 razy na dobę. Pomiędzy dawkami należy zachować co najmniej 4 godziny przerwy.

W przypadku zaburzeń czynności nerek odstępy czasowe pomiędzy dawkami powinny wynosić 8 godzin. Zawartość saszetki rozpuścić w szklance wody. Wypić bezpośrednio po przygotowaniu. Całkowita dawka paracetamolu nie może przekraczać 4g na dobę. Bez konsultacji z lekarzem lek przyjmować maksymalnie przez 5 dni.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.