Salutis Sp. z o.o.
Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

Folik x 60 tabl.

Cena: 15,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,4 mg
Opakowanie	60 tabl.(2 blist.po 30 sz
Postać	tabl.
Producent	GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.
Substancja czynna	Acidum folicum

Opis produktu

Folik stosowany jest w zapobieganiu wadom wrodzonym cewy nerwowej u potomstwa w okresie poprzedzającym zajście w ciążę oraz w I trymestrze ciąży.

Skład:
1 tabl. zawiera 400 µg kwasu foliowego.

Działanie:
Kwas foliowy należy do grupy witamin B. Jest metabolizowany w organizmie do czynnej postaci - kwasu tetrahydrofoliowego, który bierze udział w wielu reakcjach biochemicznych. Uczestniczy m.in. w syntezie związków purynowych i pirymidynowych, syntezie DNA i metabolizmie aminokwasów. Pełni także istotną rolę w tkankach, w których zachodzą liczne podziały komórkowe, zwłaszcza w układzie krwiotwórczym, nabłonku przewodu pokarmowego i tkankach płodu. Jego niedobór prowadzi do wad wrodzonych cewy nerwowej (m.in. rozszczep kręgosłupa). Przyjmowanie kwasu foliowego w okresie poprzedzającym zajście w ciążę oraz w jej początkowym okresie zmniejsza częstość występowania u potomstwa wad cewy nerwowej.

Wskazania:
Zapobieganie wadom wrodzonym cewy nerwowej u potomstwa w okresie poprzedzającym zajście w ciążę oraz w I trymestrze ciąży.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na kwas foliowy.

Działanie niepożądane:
Bardzo rzadko reakcje alergiczne (wysypka skórna, zaczerwienienie skóry, skurcz oskrzeli, gorączka).

Interakcje:
Duże dawki kwasu foliowego mogą osłabiać działanie niektórych leków przeciwpadaczkowych, np. fenytoiny.

Dawkowanie:
Kobiety w wieku rozrodczym doustnie 400 µg raz dziennie co najmniej przez miesiąc poprzedzający zajście w ciążę oraz w trakcie I trymestru.

Salutis Sp. z o.o.
Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.