



Hirudoid maść 40 g



Cena: 31,97 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	40 g
Postać	maść
Producent	SANKYO PHARMA GMBH
Substancja czynna	-

Opis produktu

Preparat zapobiega powstawaniu zakrzepów powierzchniowych, pobudza ich wchłanianie oraz wykazuje miejscowe działanie przeciwzapalne, a także przyspiesza wchłanianie krwiaków i obrzęków. Polisiarczan mukopolisacharydowy działa przeciwzakrzepowo poprzez wpływ na koagulację i układ fibrynolityczny. Ponadto wywiera działanie przeciwzapalne, hamując aktywność enzymów katabolicznych i syntezę prostaglandyn oraz wpływając na układ dopełniacza. Powoduje także regenerację tkanki łącznej przez aktywację syntezy komórek mezenchymalnych i normalizację wiązania wody przez istotę międzykomórkową. Po miejscowym zastosowaniu preparatu substancje czynne wnikają do tkanek położonych pod powierzchnią skóry, wywierając działanie lecznicze.

Skład:

Substancją czynną leku jest polisiarczan mukopolisacharydowy 0,3 g (heparynoid) - co odpowiada 25 000 j. (jednostki ustalone na podstawie oznaczenia częściowego czasu aktywowanej tromboplastyny APTT). Pozostałe składniki to glicerol 85%, 4-hydroksybenzoesan propylu, kwas stearynowy, podłoże maściowe z alkoholami lanoliny, alkohol cetosterylowy emulgujący, alkohol mirystylowy, alkohol izopropylowy, potasu wodorotlenek, tymol, woda oczyszczona.

Działanie:

Choroby żył powierzchniowych: zakrzepica żył powierzchniowych (zapalenie żył powierzchniowych), stany zapalne żyłaków, zakrzepica żył powierzchniowych po wlewach oraz iniekcjach dożylnych, żyłaki kończyn dolnych, wspomagające leczenie po zabiegach sklerotyzacji żył oraz w leczeniu zespołu pozakrzepowego. Krwiaki, stłuczenia, obrzęki. Ponadto maść stosuje się do przyspieszania procesu bliznowacenia po urazach, oparzeniach, operacjach. Żel może być stosowany również do fonoforezy (w jonoforezie podaje się go pod katodę).

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nie należy stosować na uszkodzoną skórę, otwarte rany, błony śluzowe i oczy.

Dawkowanie:

Nakładać 3-5 cm maści lub żelu na zmienione chorobowo miejsca, lekko wmasowując, raz lub kilka razy dziennie. Maść może być stosowana również pod opatrunkiem. W celu rozmiękczenia twardych blizn maść należy energicznie wmasowywać w skórę.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub



farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.