Salutis Sp. z o.o.
Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

Migea 200 mg x 4 tabl.

Cena: 30,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,2 g
Opakowanie	4 tabl.
Postać	tabl.
Producent	SANDOZ GMBH
Substancja czynna	Acidum tolfenamicum

Opis produktu

Niesteroidowy lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym Preparat Migea 200mg przeznaczony jest dla osób dorosłych, szczególnie cierpiących na ostre napady bólów migrenowych.

Skład:
1 tabletka zawiera: kwas tolfenamowy – 200mg oraz substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), makrogol 6000, kwas alginowy, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu stearylofumaran.

Działanie:
Substancją czynną leku Migea jest kwas tolfenamowy, który należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Działa on przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Substancja ta szybko i prawie w całości wchłania się z przewodu pokarmowego. Po 60-90 minutach od podania produktu osiągane jest jego maksymalne stężenie we krwi.

Zastosowanie:
Lek Migea 200mg do stosowania w ostrych napadach migreny.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku: nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku; reakcji nadwrażliwości w wywiadzie związanych ze stosowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ (np. napad astmy, ostry nieżyt nosa, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka); ciężkiej niewydolności serca, wątroby lub nerek; krwawienia (np. z przewodu pokarmowego, naczyń mózgowych lub innego czynnego krwawienia); choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy; w III trymestrze ciąży oraz u dzieci.

Działania niepożądane:
Podczas stosowania mogą wystąpić działania niepożądane – najczęściej: nudności, wymioty, niestrawność, ból brzucha, wzdęcia, biegunka, zaparcia, brak łaknienia, zapalenie błony śluzowej żołądka, krwawienie z przewodu pokarmowego oraz owrzodzenie przewodu pokarmowego, niekiedy z krwawieniem i perforacją (w tym ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób w podeszłym wieku), zapalenie błony śluzowej jelita grubego, zaostrzenie zapalenia okrężnicy, zaostrzenie choroby Leśniowskiego i Crohna, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, bardzo rzadko zapalenie wątroby, zapalenie trzustki. Długotrwałe stosowanie kwasu tolfenamowego w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.

Salutis Sp. z o.o.
Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

Dawkowanie:
Do stosowania doustnego. Dorośli, osoby w podeszłym wieku: przy wystąpieniu pierwszych objawów migreny należy zażyć 1 tabletkę. O ile nie nastąpi poprawa, przyjąć kolejną dawkę po 1-2 godzinach. Tabletkę połknąć w całości, popić wodą. Nie zażywać więcej niż 2 tabletki w ciągu doby.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.