



Mucovagin żel 25 g

Salutis Sp. z o.o.
Trześciowska 59i, Lublin
+48 605780782



Cena: 45,89 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	25 g (tuba alum.)
Postać	tuba+akcesoria
Producent	VERCO
Substancja czynna	-

Opis produktu

MUCOVAGIN żel dopochwowy odpowiada za nawilżenie i regenerację błony śluzowej pochwy. Przyspiesza jej gojenie. Skutecznie usuwa i łagodzi objawy jej przesuszenia. Ułatwia kontakty seksualne.

Skład:

kwasy hialuronowe (w postaci soli sodowej kwasu hialuronowego), woda, glikol propylenowy, karbomer, trójetanoloamina

Działanie:

MUCOVAGIN w postaci żelu dopochwowego działa na bazie kwasu hialuronowego, który łączy się z wilgotną wydzieliną śluzówki pochwy i tworzy na jej powierzchni żelową warstwę. Dzięki temu skutecznie zabezpiecza błonę śluzową. Jednocześnie przyczynia się do powstania warunków, niezbędnych do pobudzenia naturalnych mechanizmów odpowiadających za odnowę i ochronę. W efekcie powstała powłoka ochronna zabezpiecza przed rozwojem flory patogenicznej. Reguluje nawilżenie i właściwą wilgotność oraz wspomaga i przyspiesza procesy regeneracyjne uszkodzonej śluzówki. MUCOVAGIN ułatwia stosunki seksualne.

Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na substancje składowe produktu
- krwawienie miesięczne

Wskazania:

Stosować żel przede wszystkim w przypadku atrofii i dystrofii. Wskazany po porodzie, zabiegach ginekologicznych, a także przy suchości śluzówki pochwy mającej związek z wiekiem albo deficytem estrogenów w okresie okołomenopauzalnym. Polecany również pomocniczo w stanach dystrofii spowodowanych przewlekłym przyjmowaniem glikokortykoidów.

Sposób użycia:

Stosować wewnętrznie, dopochwowo albo zewnętrznie na okolice organów płciowych. Przed zastosowaniem i po użyciu produktu zaleca się dokładnie umyć ręce. Niewielką ilość żelu nanieść na wybrane miejsce w obrębie sfer intymnych. Stosować co 3 dni, wieczorem przed pójściem spać. Nie używać dłużej niż miesiąc.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań



niepożądanym i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.