



## Nasivin soft 0.01% krople do nosa 5 ml

Cena: 34,39 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	0,1 mg/1ml
Opakowanie	5 ml
Postać	krop.do nosa
Producent	MERCK SELBSTMEDICATION GMBH
Substancja czynna	Oxymetazolini hydrochloridum

### Opis produktu

#### Działanie:

Lek Nasivin soft 0,01% zawiera jako substancję czynną oksymetazolini chlorowodorek, który zwęża naczynia krwionośne. Podanie leku Nasivin soft 0,01% zmniejsza obrzęk zmienionej zapalnie błony śluzowej i hamuje nadmierne wydzielanie, co ułatwia swobodne oddychanie przez nos. Zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa powoduje również otwarcie i rozszerzenie przewodów odprowadzających zatok przynosowych i odblokowuje trąbki słuchowe. Ułatwia to usuwanie wydzieliny i wyleczenie zakażenia bakteryjnego. Nasivin soft 0,01% nie zawiera substancji konserwujących.

#### Wskazania:

Obrzęk błon śluzowych występujących w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego.

#### Dawkowanie:

Nasivin Soft 0,01% - niemowlęta powyżej 3 miesiąca życia do ukończenia 1 roku życia 1 do 2 kropli do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę.


#### Przeciwwskazania:

Suche zapalenie błony śluzowej nosa (Rhinitis sicca). Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

W poniższych przypadkach preparat można zastosować wyłącznie po uprzednim dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka:

- leczenie inhibitorami monoaminoooksydazy (inhibitory MAO) i innymi lekami, które mogą zwiększać ciśnienie krwi;
- zwiększone ciśnienie śródgałkowe, szczególnie w przypadku jaskry z zamkniętym kątem przesączania;
- ciężkie choroby serca i naczyń krwionośnych (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze);
- guz chromochłonny nadnerczy;
- zaburzenia metaboliczne (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca).

#### Działania niepożądane:

- 
- często: pieczenie lub suchość błony śluzowej nosa, kichanie, zwłaszcza u pacjentów wrażliwych,
  - niezbyt często: objawy ogólnoustrojowe takie jak kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca, wzrost ciśnienia tętniczego,
  - rzadko: ból głowy, bezsenność, zmęczenie,
  - w rzadkich przypadkach po ustąpieniu działania leku może dojść do nasilenia obrzęku błony śluzowej.

**Skład:**

1 ml roztworu zawiera:

Substancje czynne: 0,1 mg oksymetazoliny chlorowodoru,

substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, glicerol 85%, woda oczyszczona.

*Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.*