



Nasivin soft 0.025% aerozol do nosa 10 ml



Cena: 34,39 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,25 mg/1ml
Opakowanie	10 ml
Postać	aer.do nosa
Producent	MERCK SELBSTMEDICATION GMBH
Substancja czynna	Oxymetazolini hydrochloridum

Opis produktu

Działanie:

Lek Nasivin soft 0,025% zawiera substancję czynną oksymetazolini chlorowodorek, który zwęża naczynia krwionośne. Podanie leku Nasivin soft 0,025% zmniejsza obrzęk zmienionej zapalnie błony śluzowej i hamuje nadmierne wydzielanie, co ułatwia swobodne oddychanie przez nos. Zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa powoduje również otwarcie i rozszerzenie przewodów odrowadzających zatok przynosowych i odblokowuje trąbki słuchowe. Ułatwia to usuwanie wydzieliny i wyleczenie zakażenia bakteryjnego. Nasivin soft 0,025% nie zawiera substancji konserwujących.

Wskazania:

Obrzęk błon śluzowych występujących w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego.

Dawkowanie:

Nasivin Soft 0,025 % - dzieci powyżej 1 roku życia do 6 lat - 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę.

Przeciwwskazania:


Suche zapalenie błony śluzowej nosa (Rhinitis sicca). Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

W poniższych przypadkach preparat można zastosować wyłącznie po uprzednim dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka:

- leczenie inhibitorami monoaminoooksydazy (inhibitory MAO) i innymi lekami, które mogą zwiększać ciśnienie krwi;
- zwiększone ciśnienie śródgałkowe, szczególnie w przypadku jaskry z zamkniętym kątem przesączania;
- ciężkie choroby serca i naczyń krwionośnych (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze);
- guz chromochłonny nadnerczy;
- zaburzenia metaboliczne (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca).

Działania niepożądane:

Często obserwowano suchość, pieczenie błony śluzowej nosa, kichanie, zwłaszcza u wrażliwych pacjentów. Długotrwałe lub częste



Salutis Sp. z o.o.
Trześciowska 59i, Lublin
+48 605780782

stosowanie preparatu, zwłaszcza w dawkach większych niż zalecane, prowadzi do polekowego nieżyty nosa i może spowodować trwałe uszkodzenie błony śluzowej nosa i wysychający nieżyt nosa. Niezbyt często występują: kołatanie serca, tachykardia i zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi. Rzadko obserwowano ból głowy, bezsenność, zmęczenie, niepokój.

Skład:

Substancją czynną leku jest oksymetazoliny chlorowodorek.

1 ml roztworu zawiera 0,25 mg oksymetazoliny chlorowodoru.

Inne składniki leku to: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, glicerol 85%, woda oczyszczona.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.