



Nasivin soft 0.05% aerozol do nosa 10 ml

Cena: 34,39 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,5 mg/1ml
Opakowanie	10 ml
Postać	aer.do nosa
Producent	MERCK SELBSTMEDICATION GMBH
Substancja czynna	Oxymetazolini hydrochloridum

Opis produktu

Działanie:

Oksymetazolina jest sympatykomimetykiem, zwęża naczynia krwionośne i w związku z tym znosi obrzęk błony śluzowej. Preparat Nasivin soft 0,05% podany donosowo zmniejsza obrzęk zmienionej zapalnie błony śluzowej i hamuje nadmierne wydzielanie, co umożliwia choremu swobodne oddychanie przez nos. Obkurczenie błony śluzowej nosa prowadzi do otwarcia i rozszerzenia przewodów odprowadzających zatok przynosowych i oczyszczenia trąbki słuchowej.

Wskazania:

Obrzęk błon śluzowych występujących w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego.

Dawkowanie:

Nasivin Soft 0,05% - dzieci i dorośli powyżej 6 lat - 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę.

Przeciwwskazania:


Suche zapalenie błony śluzowej nosa (Rhinitis sicca). Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

W poniższych przypadkach preparat można zastosować wyłącznie po uprzednim dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka:

- leczenie inhibitorami monoaminoooksydazy (inhibitory MAO) i innymi lekami, które mogą zwiększać ciśnienie krwi;
- zwiększone ciśnienie śródgałkowe, szczególnie w przypadku jaskry z zamkniętym kątem przesączania;
- ciężkie choroby serca i naczyń krwionośnych (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze);
- guz chromochłonny nadnerczy;
- zaburzenia metaboliczne (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca).

Działania niepożądane:

Często obserwowano suchość, pieczenie błony śluzowej nosa, kichanie, zwłaszcza u wrażliwych pacjentów. Długotrwałe lub częste



stosowanie preparatu, zwłaszcza w dawkach większych niż zalecane, prowadzi do polekowego nieżyty nosa i może spowodować trwałe uszkodzenie błony śluzowej nosa i wysychający nieżyt nosa. Niezbyt często występują: kołatanie serca, tachykardia i zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi. Rzadko obserwowano ból głowy, bezsenność, zmęczenie, niepokój.

Skład:
1 ml roztworu zawiera 0,5 mg oksymetazoliny chlorowodoru. Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, glicerol 85%, woda oczyszczona.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.