



Cena: 51,64 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Dawka | 0,5 g |
| Opakowanie | 50 tabl. |
| Postać | tabl.powl. |
| Producent | AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SP.Z O.O. |
| Substancja czynna | Inosinum pranobexum |

Opis produktu

NEOSINE to preparat, który zawiera inozynę pranobeksu, odpowiadającą za podniesienie odporności organizmu. Ponadto charakteryzuje się działaniem immunostymulującym. Przeznaczony do podawania doustnego.

Skład:

Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz 4 acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3). Jedna tabletkę zawiera 500 mg inozyny pranobeksu.

Pozostałe składniki to:

skrobia pszeniczna, mannitol, powidon, magnezu stearynian.

Lek zawiera skrobię pszeniczną. Leku nie powinni stosować pacjenci z alergią (uczuleniem) na pszenicę (inną niż celiakia – zwana chorobą trzewną). Lek Neosine mogą stosować pacjenci z celiakią.

Wskazania:

Lek należy podawać osobom z zakażeniami skóry i błon śluzowych wywołanych obecnością wirusów: Herpes variacella-zoster (ospa wietrzna, półpasiec) oraz Herpes simplex typu I lub typu II (opryszczka zwykła). Zalecany także przy innych zakażeniach pochodzenia wirusowego oraz pomocniczo w przypadku osłabionego układu odpornościowego.

Działanie:

Preparat ma postać tabletek przeznaczonych do stosowania doustnego. Działa na bazie inozyny pranobeksu odpowiadającej za działanie immunostymulujące i przeciwwirusowe. Lek uczestniczy w regulowaniu niewystarczającego bądź niewłaściwego mechanizmu odporności komórkowej. Odbywa się to w wyniku spowodowania odpowiedzi typu Th1, czego efektem jest dojrzewanie i różnicowanie limfocytów grasicozależnych oraz zintensyfikowanie indukowanych reakcji limfoproliferacyjnych w komórkach pobudzanych mitogenem bądź antygenem.

Preparat normalizuje mechanizmy cytotoksyczności limfocytów grasicozależnych i komórek NK, funkcjonowanie limfocytów supresorowych T8 oraz pomocniczych T4. Co więcej przyczynia się do wzrostu poziomu IgG oraz powierzchniowych markerów dopełniacza.

Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na substancje składowe preparatu



- aktualny napad dny moczowej
- wzrost stężenia kwasu moczowego w surowicy

Dawkowanie:

Stosować doustnie. U dorosłych zaleca się stosować 50 mg/kg mc. (zazwyczaj 1 g, tj. 2 tabl. x 3-4/24h), nie przyjmować dawki większej niż 4 g/24h. U dzieci powyżej 1 roku życia stosować 50 mg/kg mc. (przeważnie 1 ml syropu/kg mc. w 3-4 razy na dobę). Stosować lek przez 5-14 dni.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.