



Posterisan x 10 czop.



Cena: 45,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,3871 g
Opakowanie	10 czop.
Postać	czop.doodbyt.
Producent	DR KADE PHARMAZEUT.FABRIK GMBH
Substancja czynna	Escherichia coli, Hydrocortisonum

Opis produktu

Preparat do stosowania miejscowego. Zawiesina E. coli i produktów przemiany materii posiada właściwości stymulujące układ odpornościowy doprowadzając do wzrostu odpowiedzi immunologicznej nieswoistej i swoistej. Zwiększa odporność na zakażenia miejscowe, posiada właściwości przeciwzapalne i uszczelniające naczynia krwionośne. Zmniejsza żylaki odbytu w stopniu I i I/II.

Skład:

Substancja czynna: 1 czopek zawiera 387,1 mg wodnej zawiesiny z 660 mln inaktywowanych bakterii Escherichia coli.

Wskazania:

Żylaki odbytu zewnętrzne i wewnętrzne w stopniu I i I/II, wyprysk okołoodbytniczy, świąd odbytu, szczeliny i pęknięcia okołoodbytnicze.

Dawkowanie:

2 razy dziennie (rano i wieczorem) wprowadza się do odbytnicy po 1 czopku, najlepiej po wypróżnieniu.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.