



Proktosedon maść doodbyt.



Cena: 40,14 PLN

Opis słownikowy

Dawka	(5mg+10mg+5mg+10mg)/
Opakowanie	15 g
Postać	maść doodbyt.
Producent	POLMEX SP. Z O.O.
Substancja czynna	Cinchoc.hydr.,Esculinum,Hydrocort.,Neomy

Opis produktu

Maść PROKTOSEDON jest wskazana w leczeniu hemoroidów zewnętrznych i wewnętrznych, w przewlekłych i ostrych stanach zapalnych odbytu, szczeliny odbytu (fissura ani) i świądzie odbytu. Może być stosowana w okresie przed- i pooperacyjnym.

Skład:


1 g maści zawiera:

- 5 mg hydrokortyzonu w postaci octanu (Hydrocortisonum)
- 5 mg chlorowodoru cynchokainy (Cinchocaini hydrochloridum)
- 10 mg siarczanu neomycyny (Neomycini sulfas)
- 10 mg eskuliny w postaci półtorawodzianu (Esculinum)
- Substancje pomocnicze: parafina ciekła, wazelina biała, lanolina bezwodna

Działanie:

- Hydrokortyzon jest głównym kortykosteroidem wydzielanym przez korę nadnerczy. Po podaniu miejscowym działa przeciwzapalnie, przeciwuczuleniowo, przeciwobrzękowo i przeciwświądowo. Hydrokortyzon jest farmakologicznie czynny, w odróżnieniu od kortyzonu, który dopiero w wątrobie jest przekształcany do postaci czynnej – hydrokortyzonu. Chociaż hydrokortyzon wykazuje szereg działań niepożądanych na skórę, należy wziąć pod uwagę, że jego właściwości mogą się nieco zmieniać w zależności od postaci leku, składu substancji pomocniczych oraz innych czynników mogących wpływać na stopień wchłaniania z miejsca podania, w tym stopień uszkodzenia skóry lub błon śluzowych.
- Neomycyna jest antybiotykiem o szerokim zakresie działania, stosowanym miejscowo w leczeniu zakażeń skóry, wywołanych przez wrażliwe szczepy gronkowców i innych drobnoustrojów. Antybiotyk ten prawdopodobnie hamuje syntezę białek wrażliwych drobnoustrojów, wiążąc się z podjednostkami rybosomów. Działa na wiele szczepów bakterii Gram-ujemnych, w tym *Campylobacter* (*Citrobacter*) spp., *Escherichia* spp., *Enterobacter* spp., *Klebsiella* spp., *Proteus* spp., *Providencia* spp., *Pseudomonas* spp. i *Serratia* spp.
- Cynchokaina jest środkiem miejscowo znieczulającym o budowie amidowej, stosowanym w znieczuleniu powierzchniowym i dokanałowym. Jest jednym z najsilniej i najdłużej działających, ale i najbardziej toksycznych środków miejscowo znieczulających.
- Eskulina hamuje krwawienia z naczyń i zmniejsza obrzęki. Lek zmniejsza objawy występujące w żylakach odbytu, tj. stan zapalny, ból, świąd, obrzęk i krwawienie.

Dawkowanie:



Proktosedon należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Stosować przez trzy do sześciu dni, do ustąpienia stanu zapalnego.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Proktosedon jest za mocne lub za słabe lub w przypadku braku skuteczności, należy zwrócić się do lekarza.

Sposób podawania:

Za pomocą aplikatora nakładać niewielką ilość maści do odbytu i na zewnątrz, rano i wieczorem oraz po każdym wypróżnieniu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.