Salutis Sp. z o.o.
Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

Ulgix Wzdęcia Max x 30 kaps.

Cena: 25,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 kaps.
Postać	kaps.miękkie
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ
Substancja czynna	-

Opis produktu

Skład:
1 kapsułka żelatynowa zawiera: 240 mg symetykonu. Substancje pomocnicze: żelatyna, glicerol, żółcień chinolinowa

Właściwości i zastosowanie:
Ulgix Wzdęcia Max stosowany jest:
• do łagodzenia objawów związanych z nadmiernym nagromadzeniem gazów w jelitach, takich jak: uczucie pełności, silne wzdęcia, odbijanie
• w celu usunięcia gazów i powietrza przed wykonaniem badań diagnostycznych w obrębie jamy brzusznej, dla poprawy jakości obrazów uzyskiwanych techniką radiologiczną, ultrasonograficzną i endoskopową.

Działanie:
Ulgix Wzdęcia Max zawiera symetykon w wysokiej dawce. Dzięki temu zwiększa się efektywność działania preparatu, co wpływa na skuteczniejsze łagodzenie dolegliwości wywoływanych przez silne wzdęcia.

Sposób stosowania:
Objawy związane z nadmiernym nagromadzeniem gazów w jelitach: wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie. Osoby powyżej 18 roku życia: 1 kapsułka 2-3 razy w ciągu doby. Przygotowanie do badań diagnostycznych: W dniu poprzedzającym badanie: 1 kapsułka wieczorem, w dniu badania: 1 kapsułka rano na czczo. Kapsułki można przyjmować przed posiłkami, po posiłkach i w trakcie posiłków popijając odpowiednią ilością płynu (około 1 szklanka wody). W przypadku pominięcia dawki nie należy podawać podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Nie przekraczać zalecanej dawki. Nie stosować wyrobu po upływie terminu ważności.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.