



Aspirin Pro 500 mg x 20 tabl.



Cena: 25,00 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Dawka | 0,5 g |
| Opakowanie | 20 tabl. |
| Postać | tabl.powl. |
| Producent | BAYER SP. Z O.O. |
| Substancja czynna | Acidum acetylsalicylicum |

Opis produktu

Skład

1 tabletkę zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego.

Wskazania i działanie

Nowa Aspirin@PRO to nowoczesna tabletkę powlekana z unikatową, opatentowaną przez firmę Bayer technologią MicroActive®. Zmikronizowane kryształki kwasu acetylosalicylowego oraz zbuforowany, musujący rdzeń tabletki zapewniają:

6 razy szybsze uwalnianie substancji aktywnej*

2,5 razy szybsze wchłanianie *

2 razy szybszy efekt przeciwbólowy

* W porównaniu do zwykłych tabletek Aspirin.

Objawowe leczenie gorączki i (lub) bólu o małym lub umiarkowanym nasileniu, np. ból głowy, dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie, bóle zębów, bóle mięśni.

Przeciwwskazania

Uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; napady astmy oskrzelowej lub reakcja alergiczna (np. pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, ciężki nieżyt nosa, wstrząs) w wywiadzie, wywołane podaniem kwasu acetylosalicylowego lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie NLPZ; choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy; skaza krwotoczna lub podwyższone ryzyko krwawienia; ciężka niewydolność nerek, wątroby lub serca; metotreksat w dawkach większych niż 20 mg na tydzień; doustne leki przeciwzakrzepowe; ciąża powyżej piątego miesiąca; dzieci poniżej 12 r.ż. bez przepisu lekarza.


Dawkowanie

Dorośli i młodzież (w wieku 16 lat i powyżej): jednorazowo 1 do 2 tabletek. W razie konieczności, dawka jednorazowa może być powtarzana po upływie co najmniej 4 godzin (nie więcej niż 6 tabletek na dobę).

Pacjenci w podeszłym wieku (65 lat i powyżej): jednorazowo 1 tabletkę. Dawka jednorazowa może być powtarzana po upływie co najmniej 4 godzin (nie więcej niż 4 tabletki na dobę).

Młodzież w wieku 12 – 15 lat (40 - 50 kg): jednorazowo 1 tabletkę. Dawka jednorazowa może być powtarzana po upływie co najmniej 4 godzin (nie więcej niż 6 tabletek na dobę).

Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować dłużej niż 3 dni w przypadku gorączki lub dłużej niż 3-4 dni w leczeniu bólu, chyba że lekarz zaleci inaczej. Tabletki należy przyjmować doustnie, z dużą ilością płynu.



Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Zwiększone ryzyko krwawień i krwotoków, wydłużenie czasu krwawienia, mogą również wystąpić krwawienia z przewodu pokarmowego i wewnątrzczaszkowe.

Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości, reakcje anafilaktyczne, astma, obrzęk naczynioruchowy.

Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy, zawroty głowy, wrażenie utraty słuchu, szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania, krwotok wewnątrzczaszkowy.

Zaburzenia żołądka i jelit: bóle brzucha, potencjalnie zagrażające życiu, jawne lub utajone krwawienia z przewodu pokarmowego (fusowate wymioty, smoliste stolce, itp.), skutkiem których może być niedokrwistość z niedoboru żelaza, choroba wrzodowa żołądka, perforacja.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwykle przemijające po zaprzestaniu leczenia, uszkodzenie wątroby, głównie na poziomie hepatocytów.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: pokrzywka, reakcje skórne.

Zaburzenia ogólne: Zespół Rey