



Nurofen Forte dla dzieci 100 ml pom.



Cena: 35,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,04 g/ml
Opakowanie	100 ml (butelka)
Postać	zaw.doust.
Producent	RECKITT BENCKISER (POLAND) S.A.
Substancja czynna	Ibuprofenum

Opis produktu

Nurofen Forte złagodzi gorączkę męczącą Twojego maluszka. Skoncentrowana formuła leku zawierająca ibuprofen zapewnia szybką i skuteczną ulgę zarówno w przypadku gorączki, jak i bólów o małym i umiarkowanym nasileniu u niemowląt od 3. miesiąca życia.

Skład:

Substancja czynna leku: ibuprofen, 40mg w każdym 1ml zawiesiny doustnej. Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sodu chlorek, sacharyna sodowa, polisorbato 80, bromek domifenu, malitol ciekły (E965), glicerol, guma ksantan, aromat pomarańczowy (skrobia modyfikowana, guma arabska, maltodekstryna, naturalne oraz identyczne z naturalnymi substancje aromatyczne), woda oczyszczona.

Działanie:

Wyjątkowo skuteczna zawiesina Nurofen Forte o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym dla dzieci już od 3. miesiąca życia. Dzięki skoncentrowanej formule już niewielka ilość dostarczy odpowiednią dawkę substancji czynnej – ibuprofenu, która zaczyna działać już po 15 minutach od podania. Przeciwgorączkowe działanie preparatu utrzymuje się aż do 8 godzin. Naturalny, pyszny, pomarańczowy smak sprawi, że dziecko nie będzie grymasić przy przyjmowaniu preparatu. Działanie leku opiera się na hamowaniu cyklooksygenazy prostaglandynowej.

Zastosowanie:

Nurofen Forte o smaku pomarańczowym przeznaczony dla dzieci do objawowego, krótkotrwałego leczenia gorączki różnego pochodzenia oraz bólu o małym lub umiarkowanym nasileniu. Może być stosowany również przez osoby dorosłe.

Informacje dodatkowe:

Produkt do stosowania już u niemowląt od 3. miesiąca życia. Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st. C w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku uczulenia na ibuprofen bądź podobne leki przeciwbólowe oraz w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek

składnik produktu. W przypadku stwierdzonej nietolerancji na niektóre cukry (w składzie znajduje się malitol ciekły) należy przed podaniem skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie:

Lek do stosowania doustnego. Stosować według zaleceń lekarza lub zgodnie z załączoną ulotką. Dla ułatwienia dawkowania do opakowania dołączono miarkę ułatwiającą właściwe odmierzenie porcji leku. Nie stosować leku dłużej niż 3 dni, jeśli objawy nie ustępują konieczną jest konsultacja lekarska.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.